



CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$

