Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=X_E-Y_E=100$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-(X_E-Y_E)=100$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=100/90=1{,}1$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-100/10=-10$



DG750−1N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=X_E-Y_E=100$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-(X_E-Y_E)=100$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=100/90=1{,}1$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-100/10=-10$



DG750−2N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=p_E Y_E=100$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-p_E Y_E=100$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=100/90=1{,}1$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-100/10=-10$



DG750−3N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=p_E Y_E=100$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-p_E Y_E=100$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=100/90=1{,}1$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-100/10=-10$



DG750−4N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=X_E-Y_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-(X_E-Y_E)=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0{,}55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG750−5N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=X_E-Y_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-(X_E-Y_E)=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0{,}55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG750−6N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=p_E Y_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=p_G Y_G=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0{,}55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG750−7N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=p_E Y_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=p_G Y_G=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0{,}55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG750−8N