Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte log(*E*) und log(*G*), $X_u=Y_u=Z_u=50$
Bunt- und Hellbezugs-Eigenwert log(*E*) für $X_E-Y_E>0$, $Y_E-Y_u>0$
log(*E*)=log($X_E-X_u-(Y_E-Y_u)$)=2, log[Y_E-Y_u)=1,6
Bunt- und Hellbezugs-Gegenwert log(*G*) für $X_E-Y_E<0$, $Y_E-Y_u<0$
log(*G*)=−log(X_E-Y_E)=−2, log[Y_E-Y_u)=−1,6
Eigen-Farbart: log(p_E)=log(X_E-Y_E) + log(Y_E-Y_u)=3,6
Gegen-Farbart: log(p_G)=−log(X_E-Y_E) + log(Y_G-Y_u)=−3,6



DG751−1N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte log(*E*) und log(*G*), $X_u=Y_u=Z_u=50$
Bunt- und Hellbezugs-Eigenwert log(*E*) für $X_E-Y_E>0$, $Y_E-Y_u>0$
log(*E*)=log($X_E-X_u-(Y_E-Y_u)$)=2, log[Y_E-Y_u)=1,6
Bunt- und Hellbezugs-Gegenwert log(*G*) für $X_E-Y_E<0$, $Y_E-Y_u<0$
log(*G*)=−log(X_E-Y_E)=−2, log[Y_E-Y_u)=−1,6
Eigen-Farbart: log(p_E)=log(X_E-Y_E) + log(Y_E-Y_u)=3,6
Gegen-Farbart: log(p_G)=−log(X_E-Y_E) + log(Y_G-Y_u)=−3,6



DG751−2N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte log(*E*) und log(*G*), $X_u=Y_u=Z_u=50$
Bunt- und Hellbezugs-Eigenwert log(*E*) für $X_E-Y_E>0$, $Y_E-Y_u>0$
log(*E*)=$p_E Y_E$=100
Bunt- und Hellbezugs-Gegenwert log(*G*) für $X_E-Y_E<0$, $Y_E-Y_u<0$
log(*G*)=*G*=−$p_E Y_E$=100
Eigen-Farbart: log(p_E)=log(X_E-Y_E) + log(Y_E-Y_u)=3,6
Gegen-Farbart: log(p_G)=−log(X_E-Y_E) + log(Y_G-Y_u)=−3,6



DG751−3N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte log(*E*) und log(*G*), $X_u=Y_u=Z_u=50$
Bunt- und Hellbezugs-Eigenwert log(*E*) für $X_E-Y_E>0$, $Y_E-Y_u>0$
log(*E*)=$p_E Y_E$=100
Bunt- und Hellbezugs-Gegenwert log(*G*) für $X_E-Y_E<0$, $Y_E-Y_u<0$
log(*G*)=*G*=−$p_E Y_E$=100
Eigen-Farbart: log(p_E)=log(X_E-Y_E) + log(Y_E-Y_u)=3,6
Gegen-Farbart: log(p_G)=−log(X_E-Y_E) + log(Y_G-Y_u)=−3,6



DG751−4N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=X_E-Y_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-(X_E-Y_E)=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0{,}55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG751−5N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=X_E-Y_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-(X_E-Y_E)=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0{,}55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG751−6N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=p_E Y_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=p_G Y_G=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0{,}55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG751−7N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=p_E Y_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=p_G Y_G=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0{,}55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG751−8N