XYZ_w=84.1998 , 88.59 , 96.46

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.2191$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.08376$

n = D65



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_m 475_575 C_m 380_565

B_m 380_495 M_m 575_475

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=85.421 , 88.59 , 73.08

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.2191$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.08376$

n = D50



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_m 475_575 C_m 380_565

B_m 380_495 M_m 575_475

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=89.4154 , 88.59 , 57.3

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.2191$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.08376$

n = P40



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m *565_770* Y_m *495_770*

G_m *475_575* C_m *380_565*

B_m *380_495* M_m *575_475*

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=97.3152 , 88.59 , 31.52

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.2191$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.08376$

n = A00



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_m 475_575 C_m 380_565

B_m 380_495 M_m 575_475

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=88.5907 , 88.59 , 88.59

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.219$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.08376$

n = E00



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_m 475_575 C_m 380_565

B_m 380_495 M_m 575_475

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=86.8818 , 88.59 , 104.73

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.2196$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.08376$

n = C00



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_m 475_575 C_m 380_565

B_m 380_495 M_m 575_475

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=90.421 , 88.59 , 71.81

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.219$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.0876$

n = P00



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m *565_770* Y_m *495_770*

G_m *475_575* C_m *380_565*

B_m *380_495* M_m *575_475*

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=86.7591 , 88.59 , 105.38

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.2191$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.08376$

n = Q00



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_m 475_575 C_m 380_565

B_m 380_495 M_m 575_475

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=83.9954 , 88.59 , 95.08

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.2191$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.08376$

n = D65



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_m 475_575 C_m 380_565

B_m 380_495 M_m 575_475

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=85.6893 , 88.59 , 72.12

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.2191$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.08376$

n = D50



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_m 475_575 C_m 380_565

B_m 380_495 M_m 575_475

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=90.1416 , 88.59 , 57.09

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.2191$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.08376$

n = P40



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_m 475_575 C_m 380_565

B_m 380_495 M_m 575_475

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=98.468 , 88.59 , 31.18

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.2191$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.0835$

n = A00



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_m 475_575 C_m 380_565

B_m 380_495 M_m 575_475

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=88.5818 , 88.59 , 88.59

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.2191$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.08376$

n = E00



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_m 475_575 C_m 380_565

B_m 380_495 M_m 575_475

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=86.1862 , 88.59 , 102.89

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.2191$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.08376$

n = C00



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_m 475_575 C_m 380_565

B_m 380_495 M_m 575_475

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=90.6941 , 88.59 , 71.98

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.2191$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.08376$

n = P00



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_m 475_575 C_m 380_565

B_m 380_495 M_m 575_475

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})

XYZ_w=86.5081 , 88.59 , 104.91

$a^* = 500\,(a' - a'_n)\,Y^{1/3}$

$b^* = 500\,(b' - b'_n)\,Y^{1/3}$

$a' = a_2\,[x/y]^{1/3}$

$b' = b_2\,[z/y]^{1/3}$

$a_2=[1/X_{D65}]^{1/3}=0.2191$

$b_2=-[1/Z_{D65}]^{1/3}=-0.08376$

n = Q00



CIELAB D65

Nom et la gamma spectrale

R_m 565_770 Y_m 495_770

G_m 475_575 C_m 380_565

B_m 380_495 M_m 575_475

Couleurs optimales (o), Y_W=88,6

6 de la chroma maximum (m) C_{AB} pour

dans le diagramme de chroma (a^*_{D65}, b^*_{D65})