




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und D65-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und D65-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und D65-sRGB-Daten



CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und D65-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und D65-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_{-770}$, $B_m=380_{-520}$, und D65-sRGB-Daten

Normfarbwert Y , RG -, YB - und radiale Buntwerte A , B , CAB
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_{-770}$, $B_m=380_{-520}$, und D65-sRGB-Daten

a^* , b^* , CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_{-770}$, $B_m=380_{-520}$, und D65-sRGB-Daten

Normfarbwert Y und Farbarten a , b , c_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und D50-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und D50-sRGB-Daten

Normfarbwert Y , RG -, YB - und radiale Buntwerte A , B , CAB
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und D50-sRGB-Daten


CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und D50-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und D50-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und D50-sRGB-Daten

Normfarbwert Y , RG -, YB - und radiale Buntwerte A , B , CAB
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_{-770}$, $B_m=380_{-520}$, und D50-sRGB-Daten

a^* , b^* , CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und D50-sRGB-Daten


a , b Normfarbwert Y und Farbarten a , b , c_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und P40-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und P40-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und P40-sRGB-Daten

CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von *Ostwald-Farben* von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und P40-sRGB-Daten

CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von *Ostwald-Farben* von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und P40-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und P40-sRGB-Daten

Normfarbwert Y , RG -, YB - und radiale Buntwerte A , B , CAB
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_{-770}$, $B_m=380_{-520}$, und P40-sRGB-Daten

a^* , b^* , CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von *Ostwald-Farben* von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und P40-sRGB-Daten

a, *b* Normfarbwert *Y* und Farbarten *a*, *b*, *c*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und A00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und A00-sRGB-Daten

100 Normfarbwert Y , RG -, YB -und radiale Buntwerte A , B , CAB
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von *Ostwald-Farben* von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und A00-sRGB-Daten

CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und A00-sRGB-Daten

CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und A00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und A00-sRGB-Daten

Normfarbwert Y , RG -, YB - und radiale Buntwerte A , B , CAB
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und A00-sRGB-Daten

a^* , b^* , CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und A00-sRGB-Daten


a , b Normfarbwert Y und Farbarten a , b , c_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und E00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und E00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und E00-sRGB-Daten



CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und E00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und E00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_{-770}$, $B_m=380_{-520}$, und E00-sRGB-Daten

Normfarbwert Y , RG -, YB - und radiale Buntwerte A , B , CAB
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und E00-sRGB-Daten

a^* , b^* , CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_{-770}$, $B_m=380_{-520}$, und E00-*sRGB*-Daten


a, *b* Normfarbwert *Y* und Farbarten *a*, *b*, *c*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und C00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und C00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und C00-sRGB-Daten

CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von *Ostwald-Farben* von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und C00-sRGB-Daten

CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und C00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_{-770}$, $B_m=380_{-520}$, und C00-sRGB-Daten

Normfarbwert Y , RG -, YB - und radiale Buntwerte A , B , CAB
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_{-770}$, $B_m=380_{-520}$, und C00-sRGB-Daten

a^* , b^* , CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und C00-sRGB-Daten


Normfarbwert Y und Farbarten a , b , c_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und P00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und P00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und P00-sRGB-Daten


CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und P00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und P00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und P00-sRGB-Daten

Normfarbwert Y , RG -, YB - und radiale Buntwerte A , B , CAB
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_{-770}$, $B_m=380_{-520}$, und P00-sRGB-Daten

a^* , b^* , CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und P00-sRGB-Daten


a , b Normfarbwert Y und Farbarten a , b , c_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und Q00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_{-770}$, $B_m=380_{-520}$, und Q00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und Q00-sRGB-Daten



CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und Q00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, und Q00-sRGB-Daten




CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_{-770}$, $B_m=380_{-520}$, und Q00-sRGB-Daten

Normfarbwert Y , RG -, YB - und radiale Buntwerte A , B , CAB
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_{-770}$, $B_m=380_{-520}$, und Q00-sRGB-Daten

a^* , b^* , CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$, und Q00-sRGB-Daten

Normfarbwert Y und Farbarten a , b , c_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$

