
logarithm. M_a, U_o-Daten
$M_a = (L_o \cdot G_o)^{0,5}$
$\log M_a = (\log L_o + \log G_o)/2$
$\log [M_a, L_o, G_o, U_o]$
$\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$
$\log L_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{520}]^2$
$\log G_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{570}]^2$
Adaptation: λ_{LG}=545
520 545 570
0
−1
−2
Schwelle
S_a=0,0
−3,1 −1,1 0,0 0,9 2,9 u
400 500 555 600 700 λ/nm

TG340−7A


logarithm. U_o-Sättigung
$M_a = (L_o \cdot G_o)^{0,5}$
$\log M_a = (\log L_o + \log G_o)/2$
$\log [L_o/U_o, G_o/U_o, M_a/U_o]$
$\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$
$\log L_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{520}]^2$
$\log G_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{570}]^2$
Adaptation: λ_{LG}=545
520 545 570
Schwelle
S_a=0,0
1
0
−1
−3,1 −1,1 0,0 0,9 2,9 u
400 500 555 600 700 λ/nm


logarithm. G_a, U_o-Daten
$G_a = (M_o \cdot C_o)^{0,5}$
$\log G_a = (\log M_o + \log C_o)/2$
$\log [G_a, M_o, C_o, U_o]$
$\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$
$\log M_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{495}]^2$
$\log C_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{545}]^2$
Adaptation: λ_{MC}=520
495 520 545
0
−1
−2
Schwelle
S_a=0,0
−3,1 −1,1 0,0 0,9 2,9 u
400 500 555 600 700 λ/nm

logarithm. U_o-Sättigung $\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$

$G_a = (M_o \cdot C_o)^{0,5}$ $\log M_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{495}]^2$

$\log G_a = (\log M_o + \log C_o)/2$ $\log C_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{545}]^2$

$\log [M_o/U_o, C_o/U_o, G_a/U_o]$ Adaptation: λ_{MC}=520



logarithm. C_a, U_o-Daten

$C_a = (G_o \cdot B_o)^{0,5}$

$\log C_a = (\log G_o + \log B_o)/2$

$\log [\ C_a, G_o, B_o, U_o\ ]$

$\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$

$\log G_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{470}]^2$

$\log B_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{520}]^2$

Adaptation: λ_{GB}=495




logarithm. U_o-Sättigung
$C_a = (G_o \cdot B_o)^{0,5}$
$\log C_a = (\log G_o + \log B_o)/2$
$\log [G_o/U_o, B_o/U_o, C_a/U_o]$
$\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$
$\log G_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{470}]^2$
$\log B_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{520}]^2$
Adaptation: λ_{GB}=495
470 495 520
Schwelle
S_a=0,0
1
0
−1
−3,1 −1,1 0,0 0,9 2,9 u
400 500 555 600 700 λ/nm


logarithm. B_a, U_o-Daten
$B_a = (C_o \cdot S_o)^{0,5}$
$\log B_a = (\log C_o + \log S_o)/2$
$\log [B_a, C_o, S_o, U_o]$
$\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$
$\log C_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{445}]^2$
$\log S_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{495}]^2$
Adaptation: λ_{CS}=470
445
470
495
0
−1
−2
Schwelle
S_a=0,0
−3,1
−1,1
0,0
0,9
2,9
u
400
500
555
600
700
λ/nm

logarithm. U_o-Sättigung

$B_a = (C_o \cdot S_o)^{0,5}$

$\log B_a = (\log C_o + \log S_o)/2$

$\log [C_o/U_o, S_o/U_o, B_a/U_o]$

$\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$

$\log C_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{445}]^2$

$\log S_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{495}]^2$

Adaptation: λ_{CS}=**470**




logarithm. M_a, U_o-Daten
$M_a = (L_o \cdot G_o)^{0,5}$
$\log M_a = (\log L_o + \log G_o)/2$
log [M_a, L_o, G_o, U_o]
$\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$
$\log L_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{520}]^2$
$\log G_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{570}]^2$
Adaptation: λ_{LG}=545
520 545 570
0
−1
−2
Schwelle
S_a=0,025
log S_a=−1,6
−3,1 −1,1 0,0 0,9 2,9 u
400 500 555 600 700 λ/nm


logarithm. U_o-Sättigung
$\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$
$M_a = (L_o \cdot G_o)^{0,5}$
$\log L_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{520}]^2$
$\log M_a = (\log L_o + \log G_o)/2$
$\log G_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{570}]^2$
$\log [L_o/U_o, G_o/U_o, M_a/U_o]$
Adaptation: $\lambda_{LG}=545$
520 545 570
Schwelle
$S_a=0{,}025$
$\log S_a=-1{,}6$
1
0
−1
−3,1 −1,1 0,0 0,9 2,9 u
400 500 555 600 700 λ/nm

logarithm. G_a, U_o-Daten

$G_a = (M_o \cdot C_o)^{0,5}$

$\log G_a = (\log M_o + \log C_o)/2$

log [G_a, M_o, C_o, U_o]

$\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$

$\log M_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{495}]^2$

$\log C_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{545}]^2$

Adaptation: λ_{MC}=520



logarithm. U_o-Sättigung $\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$

$G_a = (M_o \cdot C_o)^{0,5}$ $\log M_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{495}]^2$

$\log G_a = (\log M_o + \log C_o)/2$ $\log C_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{545}]^2$

$\log [M_o/U_o, C_o/U_o, G_a/U_o]$ Adaptation: λ_{MC}=520



logarithm. C_a, U_o-Daten

$C_a = (G_o \cdot B_o)^{0,5}$

$\log C_a = (\log G_o + \log B_o)/2$

$\log [\ C_a, G_o, B_o, U_o\ ]$

$\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$

$\log G_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{470}]^2$

$\log B_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{520}]^2$

Adaptation: λ_{GB}=495



logarithm. U_o-Sättigung $\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$

$C_a = (G_o \cdot B_o)^{0,5}$ $\log G_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{470}]^2$

$\log C_a = (\log G_o + \log B_o)/2$ $\log B_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{520}]^2$

$\log [G_o/U_o, B_o/U_o, C_a/U_o]$ Adaptation: $\lambda_{GB}=495$



logarithm. B_a, U_o-Daten

$B_a = (C_o \cdot S_o)^{0,5}$

$\log B_a = (\log C_o + \log S_o)/2$

log [B_a, C_o, S_o, U_o]

$\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$

$\log C_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{445}]^2$

$\log S_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{495}]^2$

Adaptation: λ_{CS}=**470**



logarithm. U_o-Sättigung

$B_a = (C_o \cdot S_o)^{0,5}$

$\log B_a = (\log C_o + \log S_o)/2$

$\log [C_o/U_o, S_o/U_o, B_a/U_o]$

$\log U_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{557}]^2$

$\log C_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{445}]^2$

$\log S_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{495}]^2$

Adaptation: λ_{CS}=**470**