

### Farbschwellen-Formel LABJNDS 1985 (JND = just noticeable difference)

$$\Delta E_{JND}^* = Y_0 [ (\Delta Y)^2 + (a_0 \Delta a'' \cdot Y)^2 + (b_0 \Delta b'' \cdot Y)^2 ]^{1/2} / (s + q \cdot Y^g)$$
$$a = x/y \quad a_n = x_n/y_n \quad b = -0,4 z/y \quad b_n = -0,4 z_n/y_n$$
$$a'' = a_n + (a - a_n) / (1 + 0,5 |a - a_n|) \quad n = D65 \text{ oder } A \text{ (Umfeld)}$$
$$b'' = b_n + (b - b_n) / (1 + 0,5 |b - b_n|)$$
$$Y = (Y_1 + Y_2) / 2 \quad \Delta Y = Y_1 - Y_2 \quad \Delta a'' = a_1'' - a_2'' \quad \Delta b'' = b_1'' - b_2''$$
$$s = 0,0170 \quad q = 0,0058 \quad g = 1,0$$
$$a_0 = 1,0 \quad b_0 = 1,8 \quad Y_0 = 1,5 \quad \text{Umfeld D65}$$
$$a_0 = 1,0 \quad b_0 = 1,7 \quad Y_0 = 1,0 \quad \text{Umfeld A}$$

### Just noticeable difference (JND) in vier Farbrichtungen

$$\Delta Y = \text{const} (s + q \cdot Y^g) / Y_0 \quad \text{in Leuchtdichte-Richtung } WN$$
$$\Delta a'' \cdot Y = \text{const} (s + q \cdot Y^g) / (Y_0 \cdot a_0) \quad \text{in Farbartrichtung } RG$$
$$\Delta b'' \cdot Y = \text{const} (s + q \cdot Y^g) / (Y_0 \cdot b_0) \quad \text{in Farbartrichtung } YB$$
$$\Delta c_{ab}'' \cdot Y = \text{const} (s + q \cdot Y^g) / (Y_0 \cdot [a_0^2 + b_0^2]^{1/2}) \quad \text{in jede Farbartrichtung } c_{ab}$$

0-000030-L0

VG280-3N

### Farbschwellen-Formel YCHJNDS 1996 für alle Farben o&oc, N&W

$$\Delta E_{JND}^* = Y_0 [ (\Delta Y_{\text{eff}})^2 + (\Delta c_{ab} \cdot Y_{\text{eff}})^2 ]^{1/2} / (s + q \cdot Y_{\text{eff}}^t)$$
$$Y_{\text{eff}} = Y \cdot [1 - p_{c,o} \cdot (1 - Y_0 / Y_n)]; \quad Y_0 = \text{Normfarbwert Ostwald-Farbe}$$
$$a = x/y \quad a_n = x_n/y_n \quad b = -0,4 z/y \quad b_n = -0,4 z_n/y_n \quad Y_n = 100$$
$$c_{ab} = [a_0^2 (a - a_n)^2 + b_0^2 (b - b_n)^2]^{1/2} \quad n = D65 \text{ oder } A \text{ (Umfeld)}$$
$$Y = (Y_1 + Y_2) / 2 \quad \Delta Y = Y_1 - Y_2 \quad \Delta a = a_1 - a_2 \quad \Delta b = b_1 - b_2$$
$$p_{c,o} = c_{ab} / c_{ab,o}; \quad p_{c,oc} = c_{ab} / c_{ab,oc} \quad s = 0,0170 \quad q = 0,0058 \quad t = 1,0$$
$$a_0 = 1,0 \quad b_0 = 1,8 \quad Y_0 = 1,5 \quad \text{Umfeld D65}$$
$$a_0 = 1,0 \quad b_0 = 1,7 \quad Y_0 = 1,0 \quad \text{Umfeld A}$$

### Just noticeable difference aller komplemaentärer (c) Farben o&oc, N&W

$$(a_o - a_n)Y_o = (a_{oc} - a_n)Y_{oc}; \quad (b_o - b_n)Y_o = (b_{oc} - b_n)Y_{oc}; \quad c_{ab,o}Y_o = c_{ab,oc}Y_{oc}$$
$$\Delta Y_{\text{eff}} = \text{const} (s + q \cdot Y_{\text{eff}}^t) / Y_0 \quad \text{in Leuchtdichte-Richtung } WN$$
$$\Delta c_{ab} \cdot Y_{\text{eff}} = \text{const} (s + q \cdot Y_{\text{eff}}^t) / Y_0 \quad \text{in jede Farbartrichtung } c_{ab}$$
$$\Delta c_{ab,c} \cdot Y_{c,\text{eff}} = \text{const} (s + q \cdot Y_{c,\text{eff}}^t) / Y_0 \quad \text{und für jede Sättigung } 0 \leq p_c \text{ oder } p_{c,c} \leq 1$$

0-000030-L0

VG280-7N

TUB-Prüfvorlage VG28; Farbschwellen und -räme  
LABJND, ABY, CIELAB, und Farbschwellen-Experiment

### Farbraum LINYAB 1985 (Farbdaten: lineare Beziehung zu CIE 1931)

lineare Farbgrößen	Bezeichnung und Zusammenhang mit Normfarbwerten / -anteilen	Bemerkungen
Normfarbwerte	$X, Y, Z$	
Buntwert	<i>lineares Buntwertdiagramm (A, B)</i>	$n=D65$
Rot-Grün	$A = [X/Y - X_n/Y_n] Y = [a - a_n] Y$ $= [x/y - x_n/y_n] Y$	(Umfeld)
Gelb-Blau	$B = -0,4 [Z/Y - Z_n/Y_n] Y = [b - b_n] Y$ $= -0,4 [z/y - z_n/y_n] Y$	
radial	$C_{AB} = [A^2 + B^2]^{1/2}$	
Farbartwert	<i>lineare Farbartafel (a, b)</i>	<i>vergleiche lineare Zapfensättigung</i>
Rot-Grün	$a = X/Y = x/y$	$L/(L+M) = P/(P+D)$
Gelb-Blau	$b = -0,4 [Z/Y] = -0,4 [z/y]$	$S/(L+M) = T/(P+D)$
radial	$c_{ab} = [(a - a_n)^2 + (b - b_n)^2]^{1/2}$	

0-000030-L0

VG281-3N

### Farbraum CIE 1976 (Farbdaten: nichtlineare Beziehung zu CIE 1931)

nichtlineare Farbgrößen	Name und Zusammenhang mit Normfarbwerten und -anteilen	Bemerkungen
Helligkeit	$L^* = 116 (Y/100)^{1/3} - 16 \quad (Y > 0,8)$ Näherung: $L^* = 100 (Y/100)^{1/2,4} \quad (Y > 0)$	CIELAB 1976
Buntheit	<i>nichtlineare Transformation der Buntwerte A, B</i>	
Rot-Grün	$a^* = 500 [(X/X_n)^{1/3} - (Y/Y_n)^{1/3}]$ $= 500 (a' - a_n') Y^{1/3}$	CIELAB 1976
Gelb-Blau	$b^* = 200 [(Y/Y_n)^{1/3} - (Z/Z_n)^{1/3}]$ $= 500 (b' - b_n') Y^{1/3}$	CIELAB 1976
radial	$C_{ab}^* = [a^{*2} + b^{*2}]^{1/2}$	$n=D65$ (Umfeld)
Farbart	<i>nichtlinearer Transfer der Farbartarten x/y, z/y</i>	<i>vergleiche log Zapfensättigung</i>
Rot-Grün	$a' = (1/X_n)^{1/3} (x/y)^{1/3}$ $= 0,2191 (x/y)^{1/3} \quad \text{für D65}$	$\log[L/(L+M)]$
Gelb-Blau	$b' = -0,4 (1/Z_n)^{1/3} (z/y)^{1/3}$ $= -0,08376 (z/y)^{1/3} \quad \text{für D65}$	$= \log[P/(P+D)]$ $\log[S/(L+M)]$
radial	$c'_{ab} = [(a' - a_n')^2 + (b' - b_n')^2]^{1/2}$	$= \log[T/(P+D)]$

0-000030-L0

VG281-7N

Eingabe: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-  
Ausgabe: keine Änderung