




Unbunt-Rezeptorerregungsfunktion
 $Q_{ab}[x_r/a]$ (L =Testleuchtdichte)
 L_u =Umfeld-Leuchtdichte
 $Q_{ab}[x_r/a] = \frac{b}{\ln 2} \ln \left[\frac{1}{1 + \sqrt{2} e^{x_r/a}} \right] - b$
Funktionswerte für $b=1$ und $a>0$:
 $F_{a1}[x_r/a \rightarrow -\infty] = -1$ $x = \log L, u = \log L_u$
 $F_{a1}[x_r/a = 0] = 0$ $x_r = \log[LL_u]$
 $Q_{a1}[x_r/a \rightarrow +\infty] = +1$ $x = x - u$




Ableitung der Unbunt-Rezeptorerregung
 $F'_{ab}[x_r/a]$ x_r =log(relative Leuchtdichte)
 L_u =Umfeld-Leuchtdichte
 $F'_{ab}[x_r/a] = \frac{4b}{a \{ e^{x_r/a} + e^{-x_r/a} \}^2} = \frac{b}{a \sinh^2[x_r/a]}$
Funktionswerte für $b=1$ und $a>0$:
 $F'_{a1}[x_r/a \rightarrow -\infty] = 0$ $x = \log L, u = \log L_u$
 $F'_{a1}[x_r/a = 1] = 1$ $x_r = \log[LL_u]$
 $F'_{a1}[x_r/a \rightarrow +\infty] = 0$ $x = x - u$




Unbunt-Rezeptorerregungsfunktion
 $Q_{ab}[x_r/a]$ (L =Testleuchtdichte)
 L_u =Umfeld-Leuchtdichte
 $Q_{ab}[x_r/a] = \frac{b}{\ln 2} \ln \left[\frac{1}{1 + \sqrt{2} 10^{x_r/a}} \right] - b$
Funktionswerte für $b=1$ und $a' = a \ln(10) > 0$:
 $F_{a1}[x_r/a' \rightarrow -\infty] = -1$ $x = \log L, u = \log L_u$
 $Q_{a1}[x_r/a' = 0] = 0$ $x_r = \log[LL_u]$
 $Q_{a1}[x_r/a' \rightarrow +\infty] = +1$ $x = x - u$




Ableitung der Unbunt-Rezeptorerregung
 $F'_{ab}[x_r/a]$ x_r =log(relative Leuchtdichte)
 L_u =Umfeld-Leuchtdichte
 $F'_{ab}[x_r/a] = \frac{4b}{a' \{ 10^{x_r/a} + 10^{-x_r/a} \}^2} = \frac{b}{a' \sinh^2[x_r/a]}$
Funktionswerte für $b=1$ und $a' = a \ln(10) > 0$:
 $F'_{a1}[x_r/a' \rightarrow -\infty] = 0$ $x = \log L, u = \log L_u$
 $F'_{a1}[x_r/a' = 1] = 1$ $x_r = \log[LL_u]$
 $F'_{a1}[x_r/a' \rightarrow +\infty] = 0$ $x = x - u$




Unbunt-Rezeptorerregungsfunktion
 $F_{ab}[x_r/a]$ x_r =log(relative Leuchtdichte)
 L_u =Umfeld-Leuchtdichte
 $F_{ab}[x_r/a] = b \frac{e^{x_r/a} - e^{-x_r/a}}{e^{x_r/a} + e^{-x_r/a}} = b \tanh[x_r/a]$
Funktionswerte für $b=1$ und $a>0$:
 $F_{a1}[x_r/a \rightarrow -\infty] = -1$ $x = \log L, u = \log L_u$
 $F_{a1}[x_r/a = 0] = 0$ $x_r = \log[LL_u]$
 $F_{a1}[x_r/a \rightarrow +\infty] = +1$ $x = x - u$



Ableitung der Unbunt-Rezeptorerregung
 $F'_{ab}[x_r/a]$ x_r =log(relative Leuchtdichte)
 L_u =Umfeld-Leuchtdichte
 $F'_{ab}[x_r/a] = \frac{4b}{a \{ e^{x_r/a} + e^{-x_r/a} \}^2} = \frac{b}{a \sinh^2[x_r/a]}$
Funktionswerte für $b=1$ und $a>0$:
 $F'_{a1}[x_r/a \rightarrow -\infty] = 0$ $x = \log L, u = \log L_u$
 $F'_{a1}[x_r/a = 1] = 1$ $x_r = \log[LL_u]$
 $F'_{a1}[x_r/a \rightarrow +\infty] = 0$ $x = x - u$



Unbunt-Rezeptorerregungsfunktion
 $F_{ab}[x_r/a]$ x_r =log(relative Leuchtdichte)
 L_u =Umfeld-Leuchtdichte
 $F_{ab}[x_r/a] = b \frac{10^{x_r/a} - 10^{-x_r/a}}{10^{x_r/a} + 10^{-x_r/a}} = b \tanh[x_r/a]$
Funktionswerte für $b=1$ und $a' = a \ln(10) > 0$:
 $F_{a1}[x_r/a' \rightarrow -\infty] = -1$ $x = \log L, u = \log L_u$
 $F_{a1}[x_r/a' = 0] = 0$ $x_r = \log[LL_u]$
 $F_{a1}[x_r/a' \rightarrow +\infty] = +1$ $x = x - u$



Ableitung der Unbunt-Rezeptorerregung
 $F'_{ab}[x_r/a]$ x_r =log(relative Leuchtdichte)
 L_u =Umfeld-Leuchtdichte
 $F'_{ab}[x_r/a] = \frac{4b}{a' \{ 10^{x_r/a} + 10^{-x_r/a} \}^2} = \frac{b}{a' \sinh^2[x_r/a]}$
Funktionswerte für $b=1$ und $a' = a \ln(10) > 0$:
 $F'_{a1}[x_r/a' \rightarrow -\infty] = 0$ $x = \log L, u = \log L_u$
 $F'_{a1}[x_r/a' = 1] = 1$ $x_r = \log[LL_u]$
 $F'_{a1}[x_r/a' \rightarrow +\infty] = 0$ $x = x - u$